

Когато работите в близост до вода или на места, Мокритрябва да се обърне внимание на здравния Последици свързани с наличието на плъхове.

Два вида лептоспироза инфекция могат да повлияят на работниците в Обединеното кралство. **Болестта на добре...** Това е сериозна и понякога фатална инфекция, която се предава на хората чрез контакт с урина от заразени плъхове.

На Хардджо форма на лептоспироза - Това се предава от говеда на хора.

Болестта на добре, е професионален риск за всеки, който работи в близост до вода, влажни зони или някъде другаде, където могат да присъстват тарифи. Това е заболяване, причинено от бактерии, които съществуват главно в урината на заразените плъхове и следователно е във водата, където живеят. Работата се счита за по-висок риск, когато има доказателства за заразяване с плъхове. Това е най-вероятно да бъде по време на ремонтни дейности или разрушаване. Други потенциални ситуации включват работа, свързана с канали, реки или канализация. Бактериите. Процфтява при влажни условия, на речни брегове или потоци и може да навлезе в тялото чрез незащитени разфасовки, драскотини, през лигавицата на носа или чрез преглъщане на инфектираната вода. Въпреки че може да не сте в тази среда на работа, все още може да влезе в контакт по време на други дейности минали време.

Симптомите **наподобява симптомите на грип**:

- По свинете
- Главоболие
- Хлад

По-късните симптоми включват

- Затягане на кожата
- Пожълтяване на кожата
- Вътрешно кървене



Какво трябва да знаете

Болестта на лептоспироза е договорена от урината на заразените плъхове. Бактериите влизат в тялото ви чрез съкращения и драскотини или през лигавицата на устата, гърлото и очите след контакт с заражена урина или замърсена вода. Това е рядко състояние в Обединеното кралство но никога по-малко реален риск. Болестта започва с грипоподобни симптоми като главоболие или мускулни болки. По-тежките случаи могат да доведат до менингит, бъбречна недостатъчност и други сериозни състояния. В редки случаи болестта може да бъде фатална.

Ако се чувствате зле с грипоподобни симптоми, важно е да посетите вашия лекар, да опишете къде сте работили и да кажете, че сте изложени на риск от лептоспироза.

Лични предпазни мерки, които трябва да се вземат

1. Обезкуражайте да присъстват плъхове на място, т. е. не оставяйте храна, лежаща наоколо, и не изхвърляйте остатъците от храната
2. Не се справят с труповете на мъртвите плъхове.
3. Носете подходящи ЛПС
4. Преди да влезете в работното си пространство, Измийте всички разфасовки, грани или язви в чиста вода, като приложите антисептично средство за почистване на раната, покрийте я с марля и нанесете водоустойчив дресинг и ЛПС, ако е необходимо.
5. Избягвайте триене на носа, устата или очите с ръцете си по време на работа

6. Измийте ръцете си и всички други открити участъци от кожата си старателно в края на всяка смяна и отстранете всяко мокро облекло възможно най-скоро
7. Не пушете, ядете или пиете без да миете ръцете си първо.

**SAFETY AS
STANDARD**