

Podczas pracy w pobliżu wody lub w innych miejscach Mokre, należy wziąć pod uwagę zdrowie Konsekwencje związane z obecnością szczurów.

Dwa rodzaje infekcji leptospiroza mogą wpływać na pracowników w Wielkiej Brytanii.

Choroba Weil- Jest to poważne, a czasem śmiertelne zakażenie, które jest przenoszone do ludzi poprzez kontakt z moczem z zakażonych szczurów.

The Hardjo postaci leptospiroza - Jest to przenoszone z bydła na ludzi.

Choroba Weil, stanowi zagrożenie dla pracy dla każdego, kto pracuje w pobliżu wody, terenów wilgotnych lub gdziekolwiek indziej, gdzie mogą być obecne stawki. Jest to choroba spowodowana przez bakterie, które występują głównie w moczu zakażonych szczurów i dlatego jest również w wodzie, gdzie żyją. Praca jest uważana za większe ryzyko, gdy istnieją dowody zarażenia szczurów. Jest to najbardziej prawdopodobne podczas prac remontowych lub rozbiórkowych. Inne potencjalne sytuacje obejmują prace związane z kanałami, rzekami lub ściekami. Bakterie Kwitnie w wilgotnych warunkach, Riverbanks lub strumieni, i może wejść do organizmu poprzez niezabezpieczone kawałki, zarysowania, przez błony śluzowej nosa lub połykania zainfekowanej wody. Chociaż może nie być w tym środowisku w pracy, może jeszcze wejść w kontakt podczas innych działań w przeszłości czasu.

Objawy **przypominają objawy grypy**:

- Gorączka
- Ból głowy
- Chill

Późniejsze objawy to

- Dokręcanie skóry
- Zażółcenie skóry
- Krwawienie wewnętrzne



Co powinieneś wiedzieć

Postać choroby Weil leptospiroza jest zakontraktowana z moczem zakażonych szczurów. Bakterie dostać się do organizmu przez kawałki i zarysowania lub przez błony śluzowej jamy ustnej, gardła i oczu po kontakcie z zainfekowanym moczu lub zanieczyszczonej wody. Jest to rzadka choroba w Wielkiej Brytanii ale nie mniej realne ryzyko. Choroba zaczyna się od objawów grypopodobnych, takich jak bóle głowy lub bóle mięśni. Cięższe przypadki mogą prowadzić do zapalenia opon mózgowych, niewydolność nerek i innych poważnych schorzeń. W rzadkich przypadkach choroba może być śmiertelna.

Jeśli wystąpią objawy grypopodobne, istotne jest, aby odwiedzić lekarza, opisać, gdzie pracują i powiedzieć, że jesteś narażony na leptospiroza.

Osobiste środki ostrożności, które należy podjąć

1. Zniechęcać obecny szczury na miejscu i.e. czynić nie zostawiać żywność leżący wokół i czynić nie wyrzucić z miejsca żywność skrzy
2. Nie obchodzić się z tuszami martwych szczurów
3. Nosić odpowiednie ŚOI
4. Przed wejściem do obszaru roboczego, umyć wszelkie kawałki, siki lub owrzodzenia w czystej wodzie, stosując środek antyseptyczny do rany, przykryć go gazą i nałożyć wodoodporny opatrunek i ŚOI, w razie potrzeby.
5. Unikaj pocierania rąk, ust lub oczu rękami podczas pracy
6. Umyj ręce, przedramiona i wszelkie inne odsłonięte obszary skóry dokładnie pod koniec każdej zmiany i Usuń wszelkie mokre ubranie tak szybko, jak to możliwe.
7. Zakaz palenia, jedzenia i picia bez uprzedniego mycia rąk.